MPOX: Vacunación

¿Cuál es la vacuna?

• JYNNEOS es una vacuna de 2 dosis que protege contra el Mpox y la viruela.

Método de administración

 Puede ser administrada intramuscular o intradermal

¿Quiénes son elegibles?

- Personas que han estado expuestas o sospechan haber estado expuestas a alguien con mpox.
- Personas que tuvieron una pareja sexual en las últimas dos semanas diagnosticadas con mpox.
- Hombres que tienen sexo con hombres, o personas transgénero o no binarias con múltiples parejas sexuales o diagnóstico reciente de ITS.
- Personas que han tenido sexo en lugares comerciales como clubes de sexo o en áreas con transmisión de mpox.
- Aquellos que tienen una pareja sexual con factores de riesgo de mpox.
- Personas que anticipan estar en situaciones de riesgo, como tener sexo con nuevas parejas o en eventos masivos.
- Viajeros a países con brotes de mpox y que planean tener sexo con una nueva pareja o en lugares de alto riesgo.
- Personas que trabajan en entornos donde están expuestas a ortopoxvirus, como laboratorios o centros de salud.

Esquema de vacunación

 Para completar la protección deben administrarse 2 dosis con 4 semanas (28 días) después de la primera dosis.



• Si no puede recibir la segunda dosis a tiempo, debe recibirla lo antes posible para completar la serie.

Efectos Secundarios

 Los efectos secundarios que pueden aparecer después de la vacunación con JYNNEOS son:



Dolor, enrojecimiento o picazón en el lugar de la vacuna



Fiebre



Dolor de



Cansancio



Náuseas



Escalofríos



Dolores musculares

• Si se administra por vía intradérmica, también pueden ocurrir los siguientes efectos secundarios en el lugar de la vacuna:

Hinchazón

Engrosamiento o decoloración de la piel

Algunos de estos efectos pueden durar varias semanas.



787-522-3985 787-765-1010





MPOX: Recomendaciones para Viajeros



Top 10 países con cantidad de casos

Estados Unidos | Brasil | República Democrática del Congo | España | Francia | Colombia | México | Reino Unido | Alemania | Perú

¿Qué hacer para evitar el contagio si va a viajar?



Evita cualquier erupción que veas en otras personas y limita el contacto piel con piel, especialmente en fiestas o clubes donde hay poca ropa y contacto cercano.



No beses, abraces, acurruques ni tengas relaciones sexuales con alquien que tenga mpox.



No compartas utensilios, platos o vasos con una persona con mpox.



No toques ni manipules la ropa de cama, toallas o ropa de una persona con mpox.



Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa desinfectante a base de alcohol, especialmente antes de comer o tocarte la cara, y después de usar el baño.



En zonas donde mpox es común, evita el contacto con animales como roedores y primates que pueden portar el virus.



Si cuidas a alguien con mpox, mantén distancia y usa equipo de protección (guantes, bata, gafas) si necesitas estar cerca.



Si al regresar de algún viaje comienza a presentar síntomas o sospecha tenerlos, manténgase en aislamiento y comuníquese con su proveedor de atención médica

Vacunación



- Los CDC recomiendan vacunarse contra el mpox si eres elegible y viajas a un país con un brote de mpox clado I, especialmente si planeas participar en ciertas actividades sexuales.
- La primera dosis debe administrarse al menos 6 semanas antes de viajar, y la segunda, 4 semanas después.
- Se necesita aproximadamente 2 semanas adicionales para alcanzar la protección máxima.
- No viaje con diagnostico o sospecha de MPOX.



INFÓRMATE



ESGAMEA AQUI



